



Grandes Cultures

AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

ILE DE FRANCE

Bulletin Technique n° 20 du 26 juin 2002 - 2 pages - Numéro ordre postal : 51

Pois

STADES : remplissage des derniers étages.

Tordeuses

Le vol se poursuit à un rythme assez soutenu, avec des captures cumulées qui dépassent les 300 en moyenne sur la région, avec des sites à plus de 500. De telles valeurs sont très rares dans la région à cette époque.

En fonction des débouchés de la culture et des exigences de qualité qui en découlent, une intervention insecticide est encore envisageable.

Maladies

L'anthracnose est globalement bien maîtrisée. Peu de botrytis sur les derniers étages. Présence anecdotique de pustules de rouille dans quelques parcelles (Passy / Seine-77, Maise et Janvry-91). Symptômes de sclerotinia sur tige (Méréville et Boutervilliers-91). Les premières étoiles d'oïdium apparaissent. On a enfin des développements parfois encore important de mildiou sur feuilles, tiges et vrilles.

Plus d'intervention nécessaire.

Féverole

STADES : 4 à 10 étages de gousses.

Maladies.

Les niveaux d'anthracnose et de botrytis restent faibles. La rouille a fait son apparition dans de nouveaux sites de suivi dans le nord et le centre Seine et Marne : Chaumes en Brie, Choisy en Brie, Chambry...

Les parcelles doivent avoir reçu une protection préventive contre la rouille.

La rouille n'a pas été détectée dans les zones plus récentes de culture : Val d'Oise, Yvelines (Ablis), sud Seine et Marne (Episy).

Ravageurs

Si les pucerons noirs ne sont généralement plus présents, on peut désormais trouver quelques pucerons verts.

Maïs

STADES : 8 à 12 feuilles.


Ravageurs

Les niveaux de pucerons restent majoritairement faibles (0 à 20 pucerons / plante).

Le vol de pyrale s'est généralisé à pratiquement tous les sites de piégeage, et les captures sont en augmentation surtout en Seine et Marne (voir tableau). Attention contrairement à la tordeuse du pois, le piégeage n'est pas quantitatif (pas de relation nombre captures / dégâts). Les premières pontes vont débuter.

Si une intervention est envisagée, celle-ci peut avoir lieu à partir de la fin de semaine-début de semaine prochaine dans les zones où le vol a démarré dans la première décade de juin.

Captures cumulées de tordeuses du pois au 24/6



Réseau SRPV - CAIF

Service Régional de la
Protection des
Végétaux
ILE DE FRANCE
10 rue du séminaire
94516 RUNGIS cedex
Tél : 01-41-73-48-00
Fax : 01-41-73-48-48

Imprime à la station
D'Avertissements
Agricoles de Rungis
Directeur gérant :
J. BOULUD

Publication périodique
C.P.P.A.P.
n°0904 B 00536
ISSN n°0767-5542

Tarifs :
Courrier 59,46 euros
Fax 68,6 euros

©, SPV Toute reproduction même partielle est soumise à notre autorisation

Maïs

Situation pyrale.

Pois

Vol important de tordeuses.

768

Quel risque pour la pyrale ?

Les prospections larvaires à l'automne que nous avons effectuées cet automne (en situations non traitées) vont dans le même sens que celles effectuées par nos collègues des régions voisines. Les niveaux de pyrale sont faibles dans la grande majorité des situations comme le montre ce tableau, sachant que l'on considère que le risque est élevé l'année suivante si l'on trouve au moins 1 larve par pied, et moyen entre 0,5 et 1 larve.

Sondages larvaires SPV- automne 2001

Région	Nbre parcelles	Nbre moyen larve pied	mini / maxi
Bourgogne	11	0,15	0 - 0,78
Centre	77	0,14	0 - 1,65
Champagne - Ardenne	58	0,25	0 - 0,8
Ile de France	38	0,07	0 - 0,24
Haute Normandie	23	0,17	0 - 0,9

Les niveaux actuels confirment ceux des années précédentes.

Le ravageur reste cependant présent, comme le montrent les résultats de piégeage chaque année, mais à des niveaux limitant son incidence. Si le risque peut donc être considéré comme limité sur un plan général, il peut toujours y avoir à l'échelon local des situations qui peuvent présenter plus de risques : présence fréquente du maïs dans le secteur, pas de broyage des résidus après récolte, exposition particulière de la parcelle.... L'aide à la décision au niveau d'une parcelle peut reposer sur le contrôle des pontes, par une observation à la face inférieure des feuilles. Si l'on trouve plus de 10% de pieds avec des pontes, le risque est réel.

Chrysomèle du maïs

Ce principal ravageur du maïs aux Etats Unis se développe depuis quelques années en Europe. Il n'a pas été détecté en France à ce jour. Une documentation sur ce ravageur est disponible sur simple demande (Tél : 01-41-73-48-00 ou fax 01-41-73-48-48).

En bref

Betteraves

La présence de noctuelles se confirme dans de nombreuses parcelles, avec de l'ordre de 1 à 2 chenilles pour 10 pieds. Exemples : Guigneville, Boutervilliers, Méréville (91), Château-Landon, Mons en Montois, Chambry (77)...

Une intervention n'est à envisager qu'en cas de fort accroissement des populations et des défoliations.

Blé

Fin du risque pucerons.

Captures de pyrale réseau SRPV - CAIF

LIEU	3-10 juin	11-17 juin	18-24 juin
77-Chambry	5	1	
77-Château Landon	14	13	18
77-Crisenoy		4	8
77-Crouy sur Ourcq		4	13
77-Doue	1	0	6
77-Episy	10	14	9
77-Fontaine Le Port	3	0	5
77-Fretoy		2	5
77-Jaulnes	6	4	4
77-Lorrez le bocage	0	7	2
77-Maisoncelles	2	4	23
77-Mons en Montois	2	3	3
77-Pécy		6	13
77-Poigny	0	0	6
77-Presles en Brie		4	20
77-Saacy / Marne	2	0	12
78-Longnes		0	2
78-Marcq	1	5	1
91-Chatignonville		1	3
91-Cheptainville	1	1	3
91-Gometz la ville	1	1	7
91-Les Granges le roi	0	0	0
91-Lisses	8	2	13
91-Méréville	0	1	4
91-Saint Escobille	0	1	1
91-Videlles	0	2	
95-Ennery		6	
95-Villeron	0		0

Colza

Nous réalisons un inventaire de situations n'ayant pas reçu de protection contre le sclerotinia, afin de tenter de comprendre les fortes différences d'attaques constatées cette année. Si vous avez des parcelles sans traitement, pouvez vous nous envoyer les renseignements suivants :

- NOM :

- LIEU :

- VARIETE(S) :

- TYPE DE SOL :

- DENSITE (pieds/m2) :

- REGULATEUR (produits) :

- DATE APPROXIMATIVE 1^{ères} FLEURS :

- HISTORIQUE PARCELLE :

2001	2000	1999
1998	1997	1996
1994	1993	1992

- NIVEAU D'ATTAQUE ESTIME :

- REMARQUES :